

Degasin®

Simetikon 280 mg
Zdravotnický prostředek

Degasin® je zdravotnický prostředek, který přináší úlevu při střevních a břišních potížích u osob s gastrointestinálními problémy způsobenými tvorbou plynu: nadýmání, plynatost a tlak v břiše.

Vlastnosti: Degasin® obsahuje účinnou látku simetikon. Přináší úlevu při střevních a břišních potížích tím, že předchází projevům nebo snižuje projev spojené s vytvářením plynů. Je vědecky prokázáno, že simetikon snižuje povrchové napětí vzduchových bublin přítomných v zažívacím ústrojí a tím:

- snižuje množství plynu, nadýmání a plynatost (protipěňivý účinek)
- snižuje plynové stíny v zažívacím traktu.

Degasin® může být také užíván při přípravě na diagnostické vyšetření v oblasti břicha (endoskopie, radiografie, vyšetření ultrazvukem).

Mechanismus účinku:

Simetikon snižuje povrchové napětí vzduchových bublin přítomných v gastrointestinálním traktu a způsobuje jejich shlukování, tím přispívá ke snížení množství plynu a napětí plynu jeho rozptýlením. Simetikon není absorbován ani metabolizován organismem, je vyloučen stolicí bez jakékoli změny.

Měkká želatinová tobolka se rychle rozpadne a poté je vyloučena z organismu. Slouží pouze jako vektor pro podání simetikonu.

Účel použití:

Tento zdravotnický prostředek je určen dospělým pro prevenci nebo zmírnění gastrointestinálních obtíží vzniklých v důsledku tvorby plynu jako je pocit nadýmání a plynatost. Může být také použit při přípravě na diagnostické vyšetření v oblasti břicha (endoskopie, radiografie, ultrazvukové vyšetření).

Návod k použití:

Pro zmírnění zažívacích potíží užívejte 1 měkkou tobolku denně po každém hlavním jídle, zapijte sklenicí vody. Měkké tobolky jsou určeny k orálnímu podání, měkká želatinová tobolka se rychle rozpustí a simetikon se uvolní do zažívacího traktu.

Maximální délka léčby je 30 po sobě jdoucích dnů.

Při přípravě na diagnostické vyšetření: dbejte pokynů Vašeho lékaře.

Pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení: simetikon 280 mg, měkká tobolka: hovězí želatina, glycerol, voda purifikovaná, oxid titaničitý (E 171), žluť SY (E 110), azorubin (E 122).

Degasin měkké tobolky neužívejte:

- v případě známé přecitlivělosti na simetikon nebo na kteroukoli další složku
- v případě střevní perforace či obstrukce zažívacího traktu.
- u dětí

Upozornění a opatření

Současné podávání levothyroxinu a simetikonu může vést ke snížení účinnosti levothyroxinu, a tím ke snížení funkce štítné žlázy.

Tento zdravotnický prostředek mohou užívat lidé s diabetem, neboť neobsahuje cukr.

Vzhledem k tomu, že se simetikon po průchodu trávicím traktem vylučuje v nezměněné formě, mohou přípravek užívat těhotné a kojící ženy. Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Bezpečnost užívání simetikonu během těhotenství nebyla posuzována.

Vedlejší účinky

Nejsou známy žádné vedlejší účinky simetikonu.

V případě výskytu jakýchkoli vedlejších účinků, informujte prosím výrobce.

Poslední revize: prosinec 2020



Walmark, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,
Česká republika, www.walmark.eu

Čtěte více: www.degasin.cz

Distributor: STADA PHARMA CZ s.r.o.,
Siemensova 2717 / 4, 155 00 Praha 5, Česká republika

CE 2265

LOT	Číslo šarže	Datum expirace
Pouze k jednorázovému použití	Výrobce	
Nepoužívejte, pokud je obal poškozen	Omezení teploty (5-25°C)	
Značka shody CE	Varování, prostudujte přiloženou dokumentaci	
Nevyhazujte výrobek nebo jeho obal do přírody	Před použitím si přečtěte návod k použití	

STADA

W A L M A R K®

Dispatch note of print out packing material

W A L M A R K®

Pharma code: 4291

Design / Year:

2014 DTP operator / Studio:

Zuzana Kněžíková / Internal

Proof num. / Date 1. proof:

7 / 21.05. 2021

Used printing material:

80 60 g Special printing technology:

- Used Colours: 1

Cut Size (mm):

146 x 177 mm

B L A C K

Degasin®

Simetikón 280 mg

Zdravotnícka pomôčka

Degasin® je zdravotnícka pomôčka, ktorá zlepšuje črevné a brušné ťažkosti u osôb s gastrointestinálnymi problémami spôsobenými tvorbou plynu: nafukovanie, plynatosť a brušná tenzia.

Vlastnosti: Degasin® obsahuje simetikón. Zlepšuje črevné a brušné ťažkosti tým, že predchádza alebo znižuje prejavy spojené s vytváraním plynov. Vedecky je preukázané, že simetikón znižuje povrchové napätie vzduchových bublín prítomných v tráviacom trakte, a tým:

- znižuje množstvo plynu, nadúvanie a plynatosť (protipienivý účinok),
- znižuje plynové tieň v čreve.

Degasin® sa môže používať aj pri príprave na diagnostické vyšetrenia v oblasti brucha (endoskopia, rádiografia, vyšetrenie ultrazvukom).

Mechanizmus účinku:

Simetikón znižuje povrchové napätie vzduchových bublín prítomných v gastrointestinálnom trakte a spôsobuje ich zhľukovanie, tým prispieva k zníženiu množstva plynu a napätiu plynu jeho rozptýlením. Simetikón nie je absorbovaný ani metabolizovaný organizmom, je vylúčený stolicou bez akejkoľvek zmeny. Mäkká želatínová kapsula sa rýchlo rozpadne a potom je vylúčená z organizmu. Služí len ako vektor pre podanie simetikónu.

Účel použitia:

Táto zdravotnícka pomôčka je určená dospelým na prevenciu alebo zmiernenie gastrointestinálnych ťažkostí vzniknutých v dôsledku tvorby plynu ako je pocit nafukovania a plynatosť. Môže sa použiť pri príprave na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha (endoskopia, rádiografia, ultrazvukové vyšetrenie).

Návod na použitie:

Na zmiernenie tráviacich ťažkostí užívajte 1 mäkkú kapsulu denne po každom hlavnom jedle, zapite pohárom vody. Mäkké kapsuly sú určené na perorálne použitie, mäkká želatínová kapsula sa rýchlo rozpustí a simetikón sa uvoľní do tráviaceho traktu.

Maximálna dĺžka ošetrovania je 30 po sebe idúcich dní.

Pri príprave na diagnostické vyšetrenie dajte na pokyny lekára.

Iba pre dospelých. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zloženie: simetikón 280 mg, mäkká kapsula: hovädzia želatína, glycerol, čistená voda, oxid titaničitý (E 171), žltá SY (E 110), azorubín (E 122).

Degasin mäkké kapsuly neužívajte:

- v prípade známej precitlivenosti na simetikón alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku
- v prípade známej črevnej perforácie alebo obštrukcie tráviaceho traktu alebo pri ich podozrení
- u detí

Upozornenie a opatrenia

Súčasné podávanie levotyroxínu a simetikónu môže viesť k zníženiu účinnosti levotyroxínu, a tým k zníženiu funkcie štítnej žľazy.

Túto zdravotnícku pomôčku môžu užívať ľudia s diabetom, pretože neobsahuje cukor.

Vzhľadom na to, že sa simetikón po prechode tráviacim traktom vylučuje v nezmenenej forme, môžu prípravok užívať tehotné a dojčiaci ženy. Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred užitím tohto prípravku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bezpečnosť užívania simetikónu počas tehotenstva sa nezhodnotila.

Možné vedľajšie účinky

Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky simetikónu.

V prípade výskytu akýchkoľvek vedľajších účinkov, informujte prosím výrobcu.

Posledná revízia: December 2020



Walmark, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,
Česká republika, www.walmark.eu

Distribútor: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.,
Digital park III. Einsteinova 19, 851 01 Bratislava,
email: stada@stada.sk

CE 2265

LOT	Číslo šarže	Dátum expirácie
Iba na jednorazové použitie	Výrobca	
Nepoužívajte, ak je obal poškodený	Hranice teploty uchovávania (5-25°C)	
CE	Značka shody CE	Varovanie
Nevyhádzajte výrobok alebo jeho obal do prírody.	Pozri návod na použitie	

W 09393,09409/L/02/CZE,SLO

STADA